

Désinfection des surfaces : Cochi-Chlor

Réf. : PT-1739

Version : 4

Processus : 3.4.1.2.2 Précautions standards

DEUTSCH

Produit, nom commercial : COCHI-CHLOR ®		Principes actifs : dichlorisocyanurate de sodium (Javel)	
Domaine d'application		Préparation de la solution	Procédure
	Désinfection des sols et de l'environnement direct lors d'isolement pour Clostridium difficile et norovirus	Solution à 0.5% : Dissoudre 10 comprimés dans 3 litres d'eau froide	Environnement direct : 1. Imprégner un chiffon avec la solution préparée puis appliquer sur la surface à désinfecter. 2. Veiller à humecter complètement la surface. 3. Laisser sécher Sols et salle de bains : Désinfecter les surfaces par voie humide, ne pas essuyer
En cours d'isolement de contact pour Clostridium difficile et Norovirus , l'environnement direct, le sol de la chambre et de la salle de bain doivent être désinfectés quotidiennement avec une solution de Javel à dilué à 0.5% jusqu'à la levée de l'isolement Cette procédure s'applique également dans d'autres secteurs tels que : Bloc opératoire, hôpital de jour, etc...			
Important : En cas de souillures par des liquides ou des matières biologiques, il est impératif de nettoyer les surfaces souillées avec un produit détergent, ensuite bien rincer le produit et terminer par la désinfection au <i>cochi-chlor</i> ®			
Conservation : • Utiliser uniquement des solutions fraîchement préparées pour la désinfection de la chambre d'isolement, en raison de la dégradation du principe actif en solution (l'eau de Javel n'est pas stable) • Conserver les comprimés à l'abri de l'humidité dans leur boîte d'origine fermée			
Incompatibilités : attention, ne mélanger qu'avec de l'eau froide !			
Précautions standard et d'utilisation : • Mettre des gants non stériles à usage unique pour la manipulation des comprimés et l'utilisation de la solution • Ne pas vaporiser ! (irritant pour les yeux et les voies respiratoires) • En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau, y compris sous les paupières et consulter si nécessaire • Travailler dans un local aéré • Utiliser Incidin™ Oxy si incompatibilité de l'eau de Javel (corrosion, altération) avec les surfaces			

Documents Liés

Flächendesinfektion – Cochi-Chlor