

Bakterien welche zusätzliche Vorsichtsmassnahmen erfordern

Ref.: PT-1639

Version: 13

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

FRANÇAIS

Organismen	Massnahmen	Dauer der Massnahmen	Entscheidungskriterien/Bemerkungen
Enterobakterien			
1. ESBL - Extended-Spectrum-Betalaktamase-produzierende Enterobakterien ausser <i>E. coli</i>	Kontakt (Tröpfchen*)	<u>Siehe ESBL-Richtlinie</u>	<u>Siehe ESBL-Richtlinie (DIR-9252)</u>
2. Carbapenemase-produzierende Enterobakterien - CPE	Kontakt (Tröpfchen*)	<u>Siehe CPE-Richtlinie</u>	<u>Siehe CPE-Richtlinie (DIR-1959)</u>
Andere Gram-negative Keime			
1. <i>Acinetobacter spp.</i>	Kontakt (Tröpfchen*)	- Falls Carbapenemase-produzierend, siehe CPE-Richtlinie - Sonst während der Dauer des Spitalaufenthalts (oder der Infektion)	- Falls Carbapenemase-produzierend (oder Verdacht), siehe CPE-Richtlinie - Falls auf weniger als 2 Antibiotikaklassen sensibel (<2) gemäss Tabelle auf Seite 3 - Oder auf Intensivpflegestation (IPS) oder Intermediate Care (IMC): alle <i>Acinetobacter</i>
2. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Kontakt (Tröpfchen*)	- Falls Carbapenemase-produzierend, siehe CPE-Richtlinie - Sonst während der Dauer des Spitalaufenthalts (oder der Infektion)	- Falls Carbapenemase-produzierend (oder Verdacht), siehe CPE-Richtlinie - Falls auf weniger als 2 Antibiotikaklassen sensibel (<2) gemäss Tabelle auf Seite 3

Bakterien welche zusätzliche Vorsichtsmassnahmen erfordern

Ref.: PT-1639

Version: 13

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

3. Andere Gram-negative nicht fermentierende Keime	Kontakt (Tröpfchen*)	- Falls Carbapenemase-produzierend, siehe CPE-Richtlinie - Sonst während der Dauer des Spitalaufenthalts (oder der Infektion)	- Falls Carbapenemase-produzierend, siehe CPE-Richtlinie - Falls auf weniger als 2 Antibiotikaklassen sensibel (<2) gemäss Tabelle auf Seite 3
4. <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	Kontakt (Tröpfchen*)	während der Dauer des Spitalaufenthalts (oder der Infektion)	Auf allen Pflegeabteilungen: bei Resistenz gegenüber Co-Trimoxazol (Bactrim®)

*Im Falle einer Atemwegsinfektion mit besagtem Mikroorganismus wird zusätzlich zur KONTAKT-Isolation noch diejenige für TRÖPFCHEN hinzugefügt.

Ref.: PT-1639

Version: 13

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

Organismen	Massnahmen	Dauer der Massnahmen	Entscheidungskriterien/Bemerkungen
Gram-positive Keime			
1. Enterokokken resistent gegen Vancomycin (VRE)	Kontakt (Tröpfchen*)		siehe <u>VRE-Richtlinie DIR-10410</u>
2. MRSA	Kontakt (Tröpfchen*)		siehe <u>MRSA-Protokoll PT-1638</u>

*Im Falle einer Atemwegsinfektion mit besagtem Mikroorganismus wird zusätzlich zur KONTAKT-Isolation noch diejenige für TRÖPFCHEN hinzugefügt.

Antibiotika-Empfindlichkeit :

1) **Pseudomonas aeruginosa** :

- Für Ceftazidim, Cefepim, Tazobac, Ciprofloxacin, Levofloxacin, bedeutet « **H** », hohe Dosis, dass eine erhöhte Antibiotika-Dosis wirksam sein kann.
- Eine aus dem Laborbefund nicht ersichtliche Empfindlichkeit gegenüber Meropenem bedeutet, dass **Meropenem** (und **ausschliesslich** dieses Antibiotikum!) sensibel ist.
- Antibiotika der Aminoglykoside-Klasse, die « **H** », hohe Dosis, erscheinen, sind als resistent zu betrachten.

2) **Acinetobacter spp.**

- Für Ciprofloxacin, bedeutet « **H** », hohe Dosis, dass eine erhöhte Antibiotika-Dosis wirksam sein kann.

3) **Stenotrophomonas maltophilia**

- Für Cotrimoxazol, bedeutet « **H** », hohe Dosis, dass eine erhöhte Antibiotika-Dosis wirksam sein kann.

In allen diesen Situationen: bitte Pflegefachfrau für Infektionsprävention und Spitalhygiene **benachrichtigen**

Ref.: PT-1639

Version: 13

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

ANTIBIOTIKAKLASSEN: Entscheidungshilfe für eine notwendige Isolation (gram-negative Keime)

Klasse	Wirksubstanz	ZIS-Liste 2021
BREITSPEKTRUM -PENIZILLINE	Piperazillin + Tazobactam	PIPERAZILLIN TAZOBACTAM®
CEPHALOSPORINE	Ceftazidim Ceftazidim avibactam Cefepim Ceftriaxon Ceftolozan tazobactam	FORTAM® ZAVICEFTA® (NICHT AUF DER LISTE) CEFEPIM ORPHA® CEFTRIAZONE ® ZERBAXA® (NICHT AUF DER LISTE)
CARBAPENEME	Imipenem Meropenem Ertapenem ¹	TIENAM® (NICHT AUF DER LISTE) MEROPENEM LABATEC® INVANZ®
TRIMETHOPRIM + SULFAMETHOXAZOL	Co-trimoxazol	BACTRIM®, NOPIL®
CHINOLONE	Ciprofloxacin Levofloxacin	CIPROFLOXACIN® / LEVOFLOXACIN®
AMINOGLYKOSIDE	Gentamicin Netilmicin Amikacin Tobramycin	GENTAMCIN HEXAL® NETROMYCIN® (NICHT AUF DER LISTE) AMIKIN® OBRACIN®

¹ Keine Bedeutung für *Pseudomonas* und *Acinetobacter* (natürliche Resistenz)

Verwandte Dokumente

Präventionsmassnahmen der Norovirus-Gastroenteritis im Spital

Transportrichtlinie für einen Patienten mit zusätzlichen Vorsichtsmassnahmen (Isolation)

Betreuung von durch MRSA kolonisierten/infizierten Patienten

Patienten mit Carbapenemase-produzierenden Bakterien (Enterobakterien CPE und nicht fermentierenden Carba-penemase-produzierenden Bakterien) und Kontaktpatienten

Bactéries nécessitant des mesures additionnelles