

## Antidotes : Liste et Indications

Dans tous les cas d'intoxication, prendre contact avec le **Tox Info Suisse** (téléphone jour et nuit : 145) <http://www.toxinfo.ch/>.

Les antidotes de la liste officielle sont disponibles :

[1] **Assortiment de base pour hôpitaux** : ces antidotes sont stockés aux urgences des hôpitaux de Brig, Viège, Sierre, Martigny.

[2] **Assortiment complémentaire pour Centres régionaux** : en plus de l'assortiment de base, la pharmacie ICH stocke ces antidotes aux urgences de l'Hôpital de Sion. En cas de besoin, pour les hôpitaux autres que Sion, le secteur Achats / Distribution de l'ICH peut être contacté au 027 60 347 32. En dehors des heures d'ouverture, prière de contacter la réception de l'hôpital de Sion au 027 60 340 00 qui transférera votre appel au pharmacien de piquet.

Voir également l'Intranet Pharmacie : <https://pharmacie.hopitalvs.ch>, sous « Informations médicaments », « Antidotes ».

Assort.	Intoxication	Antidote selon le Tox Info Suisse (alias Tox Zentrum)	Spécialité
		<b>A-B</b>	
[1]	Premiers soins lors d'intoxications par le cyanure et ses dérivés	Amylnitrite, 0.3 ml/amp	Amyl Nitrite Inhalants USP (frigo) (Imp USA)
[2]	Acides d'esters phosphoriques et carbamates, nicotine, digitaliques	Atropine (sulfate), 0.5 mg/ml, fioles de 100 ml	Atropine ICH 0,5 mg/ml inj stérile flac 100 ml
[1]		Atropine (sulfate), 0.5 mg/ml, amp de 1 ml, ou fiole à 100 ml (=50mg)	Atropine Sulfate SINTETICA 0,5 mg 1 ml amp
[1]	Antidépresseurs tricycliques, radionucléides	Bicarbonate de soude, 1 mmol/ml (8,4%), fiole à 100 ml pour perfusion	Natrium Bicarbonate 8,4% BRAUN IV 100 ml
[1]	Symptomatologie extrapyramidale, p.ex. dans les intoxications par neuroleptiques, antihistaminiques et antiémétiques	Bipéridène, 5 mg/ml, amp de 1 ml	Akineton 5 mg/ml amp 1 ml
[1]		Bipéridène, 2 mg/cpr	Akineton cpr 2 mg
[2]	Méthémoglobinémie (>30%)	Bleu de méthylène, 5 mg/ml, amp de 10 ml	Chlor methylthion proveblue 50 mg/10ml amp

Pharmacie ICH - mis à jour : février 2025

La pharmacie de l'ICH décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site extranet hors de l'HVS ou des institutions clientes. Seule la version la plus récente disponible sur l'extranet ICH fait foi.

Assort.	Intoxication	Antidote selon le Tox Info Suisse (alias Tox Zentrum)	Spécialité
		<b>C</b>	
[1]	Métaux lourds, Radionucléides	CaNa2-EDTA, 0.19 g/ml (0.5 mol/l), amp de 10 ml ou 0.13 mol/l (5%), amp de 10 ml	Calcium EDETATE de sodium SALF 10%, 10 ml amp (Imp I)
[1]	Corrosions cutanées par l'acide fluorhydrique	Calcium gluconate - Hydrogel	Calcium Gluconate Hydrogel 2.5% 40 g ICH
[1]	Fluorure, acide fluorhydrique	Calcium gluconate 13,75%, amp à 10 ml contenant 2.25 mmol de calcium	Calcium gluconate Braun 10% Amp à 10ml (Imp D)
[1]	"Antidote universel" adsorbant de nombreuses substances (à l'exception des alcools, solvants, acides et bases, fer, lithium et autres métaux)	Charbon actif	Carbovit 15g/100ml
		<b>D</b>	
[1]	Hyperthermie maligne dans le cadre d'une narcose par inhalation	Dantrolène, 20 mg de substance sèche, fiole (+ solvant 60 ml = Aqua ad iniect) Stocké en anesthésie	Dantrolen 20 mg subst seche amp
[2]	Fer, radionucléides	Deferoxamine, 500 mg de substance sèche, fiole	Desféral 500 mg 10 flac amp à 500 mg de substance sèche
[2]	Extravasation avec les anthracyclines	Dexrazoxane	Cardioxane 500 mg (Imp F)
[2]	Glycosides de la digitale (digitoxin, digoxin)	Digitalis-Antidote, 40 mg anticorps, substance sèche, fiole 4 ml	DigiFab 40 mg (frigo)
[2]	Cyanure et ses dérivés	DMAP (4-DMAP / Diméthylaminophénol), 50 mg/ml, amp de 5 ml	Dimethylaminophenol (4-DMAP) 50 mg/ml amp 5 ml (Imp D)
[2]	Mercure et autres métaux lourds; radionucléides (polonium-210)	DMPS (dimercaptopropanesulfonate), 100 mg/cpr	Dimaval (DMPS) 100 mg (Imp D)
[2]		DMPS (dimercaptopropanesulfonate), amp 50 mg/ml	Dimaval (DMPS) amp 250 mg, 5 ml (Imp D)
[2]	Plomb et autres métaux lourds; radionucléides	DMSA (acide dimercaptosuccinique), 200 mg/caps.	Succicaptal 200 mg caps (Imp F)
		<b>E-G</b>	
[1]	Ethylène glycol et méthanol	Ethanol 96% (V/V)	Alkohol konzentrat braun 95% amp 20 ml (Imp D)

Pharmacie ICH - mis à jour : février 2025

La pharmacie de l'ICH décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site extranet hors de l'HVS ou des institutions clientes. Seule la version la plus récente disponible sur l'extranet ICH fait foi.

Assort.	Intoxication	Antidote selon le Tox Info Suisse (alias Tox Zentrum)	Spécialité
[2]	Thallium; radionucléides (thallium-204, caesium-134 et -137)	Fe(III)-hexacyanoferrate (II), 0.5 g/caps.	Radiogardase-CS 500 mg caps (Imp D)
[1]	Benzodiazépines, zolpidem, zopiclone, zaléplone	Flumazénil, 0.1 mg/ml, amp de 5 ou 10 ml	Flumazenil Labatec 0,5 mg IV amp 5 ml
[2]	Ethylène glycol, méthanol	Fomepizol, 5 mg/ml, ou 1g/ml	Fomepizole 1.5 g/ 1.5ml (solution à diluer pour perfusion) (Imp USA)
[1]	Bêtabloquants	Glucagon 1 mg/ml, substance sèche de 1 mg + solvant 1 ml (Aqua ad iniectionem)	Glucagen NOVO 1 mg/ml 1 ml (frigo)
<b>H-L</b>			
[2]	Cyanure et ses dérivés	Hydroxocobalamine 5 g	Cyanokit 5 g flac-amp
[1]	Antagonistes du calcium, bêtabloquants	Insuline (pas retard, agissant rapidement)	Insuline Actrapid HM 100 UI/ml 10 ml (frigo)
[1]	Toxicité cardiovasculaire d'anesthésiques locaux lipophiles	Lipides, émulsion 20% Stocké en anesthésie	Clinoleic 20% 100 ml
<b>M-O</b>			
[1]	Torsade de pointes (p.ex. intoxications par les antidépresseurs tricycliques, la cocaïne, l'amphétamine, ses dérivés et d'autres psychostimulants) ; corrosions par l'acide fluorhydrique	Magnésium, p.ex. 0.4 ou 0.8 mmol/ml, amp de 5 ou 50 ml	Magnésiocard amp 40 mmol/50 ml
[1]	Paracétamol; amanite phalloïde, chloroforme, tétrachlorure de carbone, arsenic, et d'une manière générale en cas de stress oxydatif à la suite d'une intoxication	N-Acétylcystéine, 200 mg/ml, fiole 20 ml	Solmucol 20% antidote sol perf fl 20 ml
[1]	Opioides	Naloxone, 0.4 mg/ml, amp de 1 ml, ou 0.1 mg/ml fiole à 5 ml	Naloxon Orpha 0,4 mg/ml amp 1 ml
[2]	Acides d'esters phosphoriques	Obidoxime, 250 mg/ml, amp de 1 ml	Toxogonin 250 mg/ml amp 1ml
[2]	Intoxications par les antidiabétiques oraux du type sulfonylurée	Octréotide, 50, 100 ou 500 µg/mL, amp de 1 ml	Octreotid Labatec 0.1 mg/ml amp 1 ml
<b>P-R</b>			

Pharmacie ICH - mis à jour : février 2025

La pharmacie de l'ICH décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site extranet hors de l'HVS ou des institutions clientes. Seule la version la plus récente disponible sur l'extranet ICH fait foi.

Assort.	Intoxication	Antidote selon le Tox Info Suisse (alias Tox Zentrum)	Spécialité
[2]	Syndrome anticholinergique central	Physostigmine, salicylate, 3mg, amp subst. sèche (corresp. 2 mg physostigmine base)	Anticholium 2 mg (de physost. sal.) amp 5 ml, (Imp D)
[1]	Dérivés de la coumarine	Phytoménadione (vit. K), 10 mg/ml, amp de 1 ml	Konaktion MM 10 mg/ml amp 1ml
[1]	Isoniazide, fausse morille <i>Gyromitra esculenta</i> (hydrazine, monométhyl-hydrazine)	Pyridoxine (Vit. B6), 50 mg/ml, fiole à 20 ml	Pyridoxin-HCL 50 mg /ml ICH fiole 20 ml
		<b>S-Z</b>	
[2]	Amanite phalloïde, syndrome phalloïdien	Silibinine, 350 mg, substance sèche, fiole	Legalon Silibinine 350 mg 1 fiole
[1]	Produits moussants	Siméticone, gouttes ou compr.	Flatulex gouttes avec doseur 50 ml
[2]	Cyanure et ses dérivés	Thiosulfate de sodium, 100mg/ml, flacon perfusion 100 ml	Natrium thiosulfas 10% 100 ml (Imp D)
[2]	Intoxications par cocaïne ainsi qu'amphétamines dérivés	Urapidil, 5 mg/ml amp de 10 ml	Urapitil Stragen (urapidil) 50 mg / 10 ml
[2]	Morsures de vipères	Antivenin contre les morsures de vipères	Viperfav ou Vipera Tab (frigo) (Imp F)

**Stock spécial** : antidotes non officiels également stockés :

Hôpital	Médicament - indication	Quantité minimale
Sion (urgences)	<b>Firazyr</b> (icatibant) crises aiguës d'angio-œdème	2 seringue2 de 30mg/3ml
Sion (urgences)	<b>Praxbind</b> (idarucizumab) Antidote au Dabigatran (Pradaxa)	1 x 2 amp (frigo)

Pharmacie ICH - mis à jour : février 2025

La pharmacie de l'ICH décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site extranet hors de l'HVS ou des institutions clientes. Seule la version la plus récente disponible sur l'extranet ICH fait foi.

<b>Sion</b> (urgences) et <b>Viège</b> (IPS)	<b>Argatra</b> (Argatroban) Anticoagulation chez les adultes ayant une thrombopénie induite par l'héparine (TIH) de type II, bénéficiant d'une PCI	1 flacon perforable de 250mg/2.5ml
---	---	---------------------------------------