



DEUTSCH

Les patients porteurs/infectés par des bactéries multirésistantes à l'hôpital bénéficient, en plus des précautions standard, de mesures additionnelles de type contact.

1. Préparation du patient décédé par le personnel soignant

- Port de surblouse en gants
- Ablation des dispositifs médicaux tels que les cathéters veineux, sonde vésicale, etc.
- Désinfection du cadre du lit, potence, etc. pour sortir de la chambre et si nécessaire changement de literie
- Désinfection des mains, à la sortie de la chambre, après avoir enlevé la surblouse/gants

2. Acheminement du corps à la morgue

- Port de surblouse et gants pour le transport et le transfert du corps
- Désinfection de toutes surfaces contaminées par des liquides biologiques
- Hygiène des mains à la sortie de la morgue après avoir enlevé la surblouse et les gants

3. Préparation de la personne décédée par le personnel des pompes funèbres

- Port de surblouse
- Désinfection des surfaces en contact avec le corps, après la mise en bière
- Nettoyage et désinfection de toute surface contaminée par des liquides biologiques
- Hygiène des mains à la sortie de la morgue après avoir enlevé la surblouse et les gants

4. Environnement, déchets, linge

- Port de surblouse et gants
- Nettoyage désinfection de la chambre d'isolement selon [procédure PT-1697](#) (Levée d'isolement)
- Elimination du linge de lit dans un sac plastique ad hoc
- Désinfection du moyen de transport
- Elimination des déchets selon le lieu où l'on se trouve :
 - A la morgue : poubelle du local
 - Dans la chambre : carton déchets infectieux. selon [procédure PT-1697](#)

Remarque : Pas de précautions particulières pour la famille mais désinfection des mains après la visite

Documents Liés

Mesures lors du décès d'un patient porteur/infecté par une bactérie multirésistante (BMR)

Massnahmen beim Tod eines Patienten mit Besiedelung/ Infektion durch ein multi-resistentes Bakterium (MRB)