

## Analogues du GLP-1 enregistrés en Suisse

Molécule	Spécialité	Indication	Conservation	Présentation	Posologie usuelle
<b>Dulaglutide</b>	Trulicity®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2 (patients &gt; 10 ans)</li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Avant utilisation:</b> 2 semaines à température ambiante (15-25°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylos pré-remplis à usage unique : 0.75 mg/0.5 ml 1.5 mg/0.5 ml</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 0.75 mg <b>1x/sem</b></li> <li>Augmentation possible: 1.5 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation possible: 3 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation possible: <b>max 4.5 mg 1x/sem</b> après 4 sem</li> <li><b>Enfants et ado dès 10 ans:</b> <b>max 1.5 mg 1x/sem</b></li> </ul>
<b>Exénatide</b>	Bydureon®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2 en association avec des hypoglycémiantes oraux (patients adultes)</li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) et à plat <b>Avant utilisation :</b> 4 semaines à une température ne dépassant pas 30°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-injecteur à usage unique : 2 mg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose recommandée :</b> 2 mg <b>1x/sem</b></li> </ul>
<b>Liraglutide</b>	Victoza®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2 (patients &gt; 10 ans)</li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Conservation après ouverture:</b> 1 mois à température ambiante (15-25°C) ou au réfrigérateur (2-8°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylo pré-rempli: 6 mg/ml</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 0.6 mg <b>1x/jour</b></li> <li>Augmentation possible: 1.2 mg 1x/jour après 1 sem</li> <li>Augmentation possible: <b>max 1.8 mg 1x/jour</b> après 1 semaine</li> <li><b>Enfants et ado dès 10 ans:</b> Doses identiques à celles chez l'adulte</li> </ul>
	Saxenda®	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Obésité IMC ≥ 30 kg/m<sup>2</sup> (patients &gt; 12 ans)</b></li> <li><b>IMC ≥ 27 kg/m<sup>2</sup> en présence de comorbidités supplémentaires liées au poids</b></li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Conservation après ouverture:</b> 1 mois à température ambiante (15-25°C) ou au réfrigérateur (2-8°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylo pré-rempli: 6 mg/ml</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 0.6 mg <b>1x/jour</b></li> <li>Augmentation: 1.2 mg 1x/jour après 1 sem</li> <li>Augmentation: 1.8 mg 1x/jour après 1 sem</li> <li>Augmentation: 2.4 mg 1x/jour après 1 sem</li> <li>Augmentation (dose d'entretien): 3 mg 1x/jour après 1 sem</li> <li><b>Enfants et ado dès 12 ans:</b> Doses identiques à celles chez l'adulte (dose d'entretien 3 mg ou dose inférieure tolérée)</li> </ul>
	Xultophy® + insuline dégludec	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2, en association avec des hypoglycémiantes oraux (patients adultes)</li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Conservation après ouverture:</b> 3 semaines à température ambiante (15-25°C) ou au réfrigérateur (2-8°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylo pré-rempli 1 dose unitaire = 0.036 mg liraglutide + 1 UI insuline dégludec</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 10 doses unitaires <b>1x/jour</b> <b>Dose max :</b> 50 doses unitaires <b>1x/jour</b></li> </ul>
<b>Lixisénatide</b>	Suliqua® + insuline glargine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2, en association avec de la metformine (patients adultes)</li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Conservation après ouverture:</b> 28 jours à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas conserver au frigo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylo pré-rempli <b>100/33</b> 1 dose unitaire = 0.33 mcg lixisénatide + 1 UI insuline glargine <b>100/50</b> 1 dose unitaire = 0.5 mcg lixisénatide + 1 UI insuline glargine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 10 mcg lixisénatide <b>1x/jour</b> <b>Dose max :</b> 20 mcg lixisénatide <b>1x/jour</b></li> </ul>
<b>Sémaglutide</b>	Ozempic®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2 (patients adultes)</li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Conservation après ouverture:</b> 6 semaines à température ambiante (15-25°C) ou au réfrigérateur (2-8°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylos pré-remplis: <b>DualDose:</b> 2 mg/1.5 ml (doses de 0.25 et 0.5 mg) <b>FixDose:</b> 4 mg/3 ml (doses de 1 mg)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 0.25 mg <b>1x/sem</b></li> <li>Augmentation: 0.5 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation possible: 1 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation possible: 2 mg 1x/sem après 4 sem</li> </ul>
	Wegovy®	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Obésité IMC ≥ 30 kg/m<sup>2</sup> (patients &gt; 12 ans)</b></li> <li><b>IMC ≥ 27 kg/m<sup>2</sup> en présence de comorbidités supplémentaires liées au poids</b></li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Conservation après ouverture:</b> 6 semaines à température ambiante (15-25°C) ou au réfrigérateur (2-8°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylos <b>FixDose:</b> 0.25 mg/dose, 0.5 mg/dose, 1 mg/dose, 1.7 mg/dose, 2.4 mg/dose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 0.25 mg <b>1x/sem</b></li> <li>Augmentation: 0.5 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation: 1 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation: 1.7 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation (dose d'entretien): 2.4 mg 1x/sem après 4 sem</li> </ul>
	Rybelsus®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2 (patients adultes)</li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Ne pas conserver au-dessus de 30°C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Comprimés</b> 3 mg, 7 mg et 14 mg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 3 mg <b>1x/jour</b></li> <li>Augmentation: 7 mg 1x/jour après 4 sem</li> <li>Augmentation possible: 14 mg 1x/jour après 4 sem</li> <li>Prendre à jeun, avec de l'eau. Attendre au moins 30 minutes avant de prendre un repas, une boisson ou un autre médicament.</li> </ul>
<b>Tirzépatide</b>	Mounjaro® (analogue GLP-1 et GIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2 (patients adultes)</li> <li><b>Obésité IMC ≥ 30 kg/m<sup>2</sup></b></li> <li><b>IMC ≥ 27 kg/m<sup>2</sup> en présence de comorbidités supplémentaires liées au poids</b></li> </ul>	<p><b>Conditions de stockage:</b> Frigo (2 - 8°C) <b>Avant utilisation :</b> 21 jours à une température ne dépassant pas 30°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stylos <b>usage unique</b> 2.5 mg/dose, 5 mg/dose, 7.5 mg/dose, 10 mg/dose, 12.5 mg/dose, 15 mg/dose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dose initiale:</b> 2.5 mg <b>1x/sem</b></li> <li>Augmentation : 5 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li>Augmentation possible de 2.5 mg 1x/sem après 4 sem</li> <li><b>Dose max :</b> 15mg <b>1x/sem</b></li> </ul>

Références : [1] Swissmedicinfo, lien : <https://www.swissmedicinfo.ch/>, 06.2024 ; [2] Application Refmed (version 3.2.3), lien : <https://refmed-consult.chuv.ch/>, 06.2024.