


Institut Central des Hôpitaux
Service des maladies infectieuses

GANTS



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

LES PRECAUTIONS STANDARD

2. GANTS



Les gants sont indiqués pour la protection de l'utilisateur s'il existe un risque de contact avec des liquides biologiques, une peau lésée (patient et/ou soignant), des muqueuses, du linge ou matériel souillés, ou lors du nettoyage/ désinfection du matériel, de la préparation de certains médicaments (exemple: chimiothérapie) et du travail en laboratoire.

Le port de gant ne remplace pas l'hygiène des mains.



1. HYGIENE DES MAINS



3. MASQUE ET LUNETTES
OU MASQUE À VISIÈRE



4. SURBLOUSE ET/OU
TABLIER



5. DISPOSITIFS MÉDICAUX
ET MATÉRIEL



6. LINGE



7. DÉCHETS



8. ENVIRONNEMENT



9. PROTECTION
DU PERSONNEL



10. PROTECTION
DES PATIENTS

Points importants

1 paire de gants = 1 soin = 1 patient

- Porter des gants sur des mains propres et sèches
- Port **NON AUTOMATIQUE** lors de **Mesures Additionnelles** (risque de transmission par le biais des gants) → uniquement si MA pour gale et *Clostridioïdes difficile*
 - ① Avant d'enfiler les gants et immédiatement après leur retrait → **hygiène des mains (HM)**
- **Changer les gants :**
 - à chaque indication à l'hygiène de mains
 - en cas de perforation/ brèche
 - en cas d'utilisation prolongée
- ① **NE PAS désinfecter ou laver les gants** (risque d'altération de la qualité et par conséquent de l'étanchéité des gants).
- **EVITEZ de :**
 - stocker les gants dans une poche
 - utiliser les gants poudrés
 - porter les gants si non indiqué (gaspillage et risque de transmission des micro-organismes)
 - stocker les boîtes de gants aux endroits où il n'y a pas de risques de projections de liquide, d'humidité, de poussière et de rayonnement solaire.

Technique pour le retrait des gants



1 Pincer un gant au niveau du poignet. Eviter de toucher l'avant-bras.



2 La surface interne du gant doit se trouver à l'extérieur.



3 La main gantée tient le gant préalablement retiré. Glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le dos de la main.



4 La face interne du gant doit se trouver à l'extérieur et envelopper le gant déjà retiré.



5 Jeter les gants dans les sacs à déchets urbains (type A).



6 Se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA) immédiatement après le retrait des gants.

Extrait du guide romand des précautions standard. Avril 2017.

Contact: Service des maladies infectieuses
ICH 06/2024