


Institut Central des Hôpitaux
Service des maladies infectieuses

MASQUE ET LUNETTES OU MASQUE À VISIÈRE



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

LES PRECAUTIONS STANDARD



3. MASQUE ET LUNETTES OU MASQUE À VISIÈRE

Si risque de projections de liquides biologiques.
Lors de symptômes respiratoires (toux, rhinite, etc.)



1. HYGIÈNE DES MAINS



2. GANTS



4. SURBLOUSE ET/OU
TABLIER



5. DISPOSITIFS MÉDICAUX ET
MATÉRIEL



6. LINGE



7. DÉCHETS



8. ENVIRONNEMENT



9. PROTECTION
DU PERSONNEL



10. PROTECTION
DES PATIENTS

Points importants

Indications au port des lunettes de protection:

- Lors de risque de projection de liquides biologiques
- Si le patient présente des symptômes respiratoires

Indications au port du masque :

- Lors d'acte aseptique
- Lors de risque de projection de liquides biologiques
- Si symptômes respiratoires (patient et/ou collaborateur)

Ne doit pas :

- Être porté autour du cou, sur le menton ou être stocké dans la poche
- Être remis sur le visage une fois enlevé

ⓘ Validité max 3 heures si non souillé, humide, manipulé

ⓘ En présence de barbe, l'efficacité du masque est diminuée (augmentation des fuites)

Technique pour l'ajustage du masque médical à élastique

0



Se désinfecter les mains avant avoir mis le masque

1



Passer les élastiques autour des oreilles

2



Ouvrir et ajuster les soufflets de manière à recouvrir le nez et le menton

3



Ajuster la barrette rigide de façon à ce qu'elle épouse les contours du nez et des

4



Se désinfecter les mains après avoir mis le masque

Extrait du guide romand des précautions standard. Avril 2017.

Contact :service des maladies infectieuses
ICH 01/2024