


Surblouse ou tablier



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

LES PRECAUTIONS STANDARD



4. SURBLOUSE OU TABLIER

Si risque de projections de liquides biologiques

À usage unique par patient



1. HYGIÈNE DES MAINS



2. GANTS



3. MASQUE ET LUNETTES
OU MASQUE À VISIÈRE



5. DISPOSITIFS MÉDICAUX
ET MATÉRIEL



6. LINGE



7. DÉCHETS



8. ENVIRONNEMENT



9. PROTECTION
DU PERSONNEL



10. PROTECTION
DES PATIENTS

Points importants

Indication au port d'une surblouse ou d'un tablier :

- Protéger sa tenue professionnelle lors de risques de projections de liquides biologiques (lors de soins ou de nettoyage/désinfection).

La surblouse ou le tablier doivent être :

- Portés uniquement sur le lieu même de soin, avec toutes les attaches lacées.
- Changés :
 - Immédiatement si la surface interne est mouillée
 - Avant un soin aseptique
 - Entre deux patients

Une fois enfilés, ils ne doivent pas être manipulés pour accéder à du matériel stocké dans la tenue professionnelle (stéthoscope, solution hydro-alcoolique, stylo etc.)



① *L'utilisation d'un tablier lors de l'aide à la douche du patient ne constitue pas une indication selon les Précautions Standard.*

Technique pour l'enfilage de la surblouse ou du tablier

1



Enfiler la surblouse, partie ouverte vers l'arrière.

2



Attacher les cordons au cou. Croiser la surblouse dans le dos pour protéger les vêtements.

3



Attacher les cordons à la taille.

Technique pour le retrait et l'élimination de la surblouse ou du tablier

1



Détacher les cordons au niveau de la taille et du cou.

2



Retirer la blouse en essayant de ne pas toucher sa partie extérieure.

3



Rouler la surblouse en ne touchant que l'intérieur.

4



L'éliminer dans le sac/container à déchets urbains.

5



Se désinfecter les mains.

Extrait du guide romand des précautions standard. Avril 2017.

Contact: Service des maladies infectieuses
ICH 03/202