


Zentralinstitut der Spitäler
Abteilung für Infektionskrankheiten

HANDSCHUHE



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

STANDARDMASSNAHMEN

2. HANDSCHUHE



Handschuhe werden zum Schutz des Benutzers getragen falls das Risiko eines Kontakts mit biologischen Flüssigkeiten, verletzter Haut oder Schleimhäuten besteht.

Ein paar Handschuhe = eine Pflegehandlung

Händedesinfektion nach dem Ausziehen der Handschuhe.



1. HÄNDEHYGIENE



3. MASKE UND BRILLE ODER
GESICHTSSCHUTZMASKE



4. SCHUTZKLEIDER
UND/ODER SCHÜRZE



5. MEDIZINPRODUKTE
UND MATERIAL



6. WÄSCHE



7. ABFÄLLE



8. UMGEBUNG



9. PERSONALSCHUTZ



10. PATIENTENSCHUTZ

Wichtige Punkte

Indikationen:

Direkter Kontakt

- Biologische Flüssigkeiten
- Schleimhaut
- Verletzte Haut der Patienten/Pflegenden

Indirekter Kontakt

- Reinigung und Desinfektion von Material und Räumlichkeiten
- Medikamentenzubereitung z.B. Zytostatika
- Arbeit im Labor



**Das Handschuhtragen ersetzt nicht die Händehygiene!
Nicht systematisch bei Isolationen!**



- Die Hände müssen vor dem Anziehen der Handschuhe sauber und trocken sein.
- **Händedesinfektion :**
 - VOR dem Anziehen der Handschuhe
 - NACH dem Ausziehen der Handschuhe
- **Handschuhe wechseln :**
 - jedes Mal wenn eine Indikation zur Händehygiene besteht
 - falls sie perforiert sind
 - bei längerer Benutzung (nach 30 Minuten oder falls die Hände feucht sind)



- **KEINE** Desinfektion der Handschuhe
- **Nicht systematisch** bei Isolationen (Übertragungsrisiko durch Handschuhe)
- **Vermeiden Sie :**
 - Handschuhe in den Taschen der Arbeitskleidung aufzubewahren
 - gepuderte Handschuhe zu verwenden
 - unnötige Benutzung von Handschuhen (Verschwendungen)


Ausziehtechnik der Handschuhe

1




Beim Ausziehen den Handschuh am Handgelenk anfassen, ohne den Vorderarm zu berühren.

2



Den Handschuh so über die Hand ziehen, dass die Innenseite nach aussen gekehrt wird.

3



Den ausgezogenen Handschuh mit der anderen Hand halten, die Finger der Hand ohne Handschuh zwischen den Handschuh und den Handrücken schieben.

4



Den zweiten Handschuh über die Hand ziehen, so dass die Innenseite nach aussen gekehrt wird und dabei den bereits ausgezogenen Handschuh einwickeln.

5



Die benutzten Handschuhe im Hauskehricht entsorgen.

6



Die Hände mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel desinfizieren.

Die Handschuhschachteln müssen geschützt vor Spritzern, Feuchtigkeit, Staub und Sonnenstrahlung aufbewahrt werden.

Auszug aus dem Westschweizer Leitfaden für Standardmassnahmen. Oktober 2020.

Kontakt: Abteilung für Infektionskrankheiten
ZI 06/2024