

Zentralinstitut der Spitäler
Abteilung für Infektionskrankheiten

MASKE UND/ODER BRILLE ODER GESICHTSSCHUTZMASKE



STANDARDMASSNAHMEN



3. MASKE UND/ODER BRILLE ODER GESICHTSSCHUTZMASKE

Bei Spritzgefahr von biologischen Flüssigkeiten
Bei Atemwegssymptomen (Husten, Rhinitis, usw.)



1. HÄNDEHYGIENE



2. HANDSCHUHE



4. SCHUTZKLEIDER
UND/ODER SCHÜRZE



5. MEDIZINPRODUKTE
UND MATERIAL



6. WÄSCHE



7. ABFÄLLE



8. UMGEBUNG



9. PERSONALSCHUTZ



10. PATIENTEN-
SCHUTZ

Wichtige Punkte

Indikationen zum Tragen einer Schutzbrille:

- Bei Spritzgefahr von biologischen Flüssigkeiten
- Wenn der Patient Atemwegssymptome hat

Indikationen zum Tragen einer Maske:

- Bei aseptischen Handlungen
- Bei Spritzgefahr von biologischen Flüssigkeiten
- Bei Atemwegssymptomen (Patient und/oder Mitarbeitende)

Sie darf nicht :

- Um den Hals oder am Kinn getragen werden oder in der Tasche aufbewahrt werden
 - Nach dem Ausziehen wieder auf das Gesicht gesetzt werden
- ① Nutzungsdauer max. 3 Stunden wenn nicht verschmutzt, feucht, angefasst
- ① Durch Barthaare wird die Wirksamkeit der Maske verringert (Entstehung von Lecks am Maskenrand)

Anwendungshinweise der medizinischen Maske mit Gummibändern

0



Hände vor dem Aufsetzen der Maske desinfizieren

1



Die Gummibänder um die Ohren führen

2



Faltebalg öffnen und anpassen, so dass Nase und Kinn abgedeckt sind

3



Nasenbügel so anpassen, dass die Konturen von Nase und Wangenknochen umschlossen sind

4



Nach dem Anziehen der Maske die Hände desinfizieren

Auszug aus dem Westschweizer Leitfaden für Standardmassnahmen. Oktober 2020.

Kontakt : Abteilung für Infektionskrankheiten
ZI 01/2024