

Frage 1

Welche Aussage trifft auf folgendes Vorgehen zu:

Eine Pflegehilfe wechselt im Laufe des Tages zwischen Händewaschen und Händedesinfektion ab.

- Bei nicht sichtbar verschmutzten Händen, ist das Händedesinfektionsmittel zu bevorzugen.
- Das systematische Waschen bevorzugen.
- Beide systematisch abwechseln.

Frage 2

Wie viele Indikationen zur Händehygiene gibt es laut der WHO?

- 5
- 4
- 6

Frage 3

Wie viele Milliliter Händedesinfektionsmittel (HDM) werden für eine wirksame Händedesinfektion benötigt?

- 6
- 10
- 3

Frage 5

Wie viele Hauptgruppen der Hautflora werden auf den Händen unterschieden?

- 2
- 3
- 4

Frage 1

- Antwort: bei nicht sichtbar verschmutzten Händen, ist die Händedesinfektion zu bevorzugen.

Frage 2

Antwort: 5

Frage 3

Antwort: 3

Für eine wirksame Händedesinfektion werden in der Regel etwa 3 ml HDM verwendet, sodass alle Handflächen vollständig benetzt sind.

Frage 5

Antwort: 2 Hauptgruppen

Die residente (dauerhafte) und die transiente (vorübergehende) Hautflora.

Frage 7

Welche Strategie ist bei einer Gastro-Enteritis-Epidemie zu bevorzugen?

- Die Hände ausschliesslich mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizieren
- Nur einfaches Händewaschen
- Vor dem Verlassen des Zimmers, die Hände mit Wasser und Seife waschen und mit einer Händedesinfektion abschliessen.

Frage 8

Welches ist die richtige Technik für die Händehygiene?



Frage 11

Ich wechsele die verunreinigte Inkontinenzeinlage des Patienten: welche Handlung ist richtig?

- Ich desinfiziere mir die Hände, ziehe die Handschuhe an, um die Einlage zu wechseln.
- Ich ziehe die Handschuhe an und wechsele die Einlage

Frage 13

Wie viel Prozent der healthcare-assoziierten Infektionen werden über die Hände übertragen?

- 20%
- 5%
- 40%

Frage 7

Antwort: vor dem Verlassen des Zimmers mit Wasser und Seife waschen und mit einer Händedesinfektion abschliessen.

Frage 8

Antwort:



Frage11

Antwort: Ich desinfiziere mir die Hände, ziehe die Handschuhe an, um die Einlage zu wechseln.

Frage 13

Antwort: 40%

80% der Mikroorganismen werden mit den Händen übertragen, so dass die WHO davon ausgeht, dass 40% der healthcare-assoziierten Infektionen mit den Händen übertragen werden.

Frage 15

Wann muss man sich die Hände waschen und nicht desinfizieren?

- Wenn die Hände sichtbar verschmutzt sind
- Wenn sie mit biologischen Körperflüssigkeiten verschmutzt sind
- Nach dem Toilettengang
- Zwischen jedem Patient

Frage 17

Eine schlechte Händehygiene kann verantwortlich für die Infektionen der Patienten UND den Pflegenden sein?

- richtig
- falsch

Frage 19

Das Händedesinfektionsmittel ist ineffizient für:

- Den Schmuck
- Die Bakterien
- Die sichtbar verschmutzten Hände
- Die künstlichen Fingernägel

Frage 22

Ich messe die Vitalparameter des Patienten, das Telefon klingelt, ich nehme ab.

- Ich brauche keine Händedesinfektion zu machen, weil das Telefon sich in meiner sauberen Kasacktasche befindet.
- Eine Händedesinfektion muss vor und nach der Manipulation mit dem Telefon erfolgen
- Es ist nichts zu machen, mein Telefon wurde heute Morgen desinfiziert (die Anweisungen lauten 1x /Tag)

Frage 15

Antwort:

- Wenn die Hände sichtbar verschmutzt sind
- Wenn sie mit biologischen Körperflüssigkeiten verschmutzt sind
- Nach dem Toilettengang

Frage 17

Antwort: richtig

Frage 19

Antwort:

- Den Schmuck
- Die sichtbar verschmutzten Hände
- Die künstlichen Fingernägel

Frage 22

Antwort:

- Eine Händedesinfektion muss vor und nach der Manipulation mit dem Telefon erfolgen

Frage 25

Wann muss eine Händedesinfektion erfolgen?

- Vor dem Anziehen der Handschuhe
- Nach dem Ausziehen der Handschuhe
- Nachdem ich die Handschuhe angezogen habe

Frage 26

Sie haben Risse an den Händen, was tun Sie?

- Mit dem Händedesinfektionsmittel weiterfahren, während und nach der Arbeit eine regenerierende Schutzcreme auftragen.
- Das Waschen der Hände bevorzugen
- Das Händedesinfektionsmittel nicht mehr anwenden.

Frage 27

Was beeinträchtigt eine gute Händehygiene?

- Lackierte Fingernägel
- Lange Fingernägel
- Künstliche Fingernägel
- Das Tragen von Schmuck

Frage 29

Welches ist das Hauptziel der Händehygiene im Gesundheitswesen?

- Nur die Patienten/Klienten schützen.
- Healthcare-assoziierte Infektionen reduzieren.
- Nur die Pflegenden schützen.

Frage 25

Antwort:

- Vor dem Anziehen der Handschuhe
- Nach dem Ausziehen der Handschuhe

Frage 26

Antwort:

- Mit dem Händedesinfektionsmittel weiterfahren, während und nach der Arbeit eine regenerierende Schutzcreme auftragen.

Frage 27

Antwort:

- Lackierte Fingernägel
- Lange Fingernägel
- Künstliche Fingernägel
- Das Tragen von Schmuck

Frage 29

Antwort:

- Healthcare-assozierte Infektionen reduzieren

Frage 30

Welche ist die max. Anzahl von Händedesinfektionen zwischen zweimal Hände waschen?

- 8
- unlimitiert
- 4

Frage 34

Nach welcher Handlung ist die Händedesinfektion unabdingbar?

- Bevor ich das Zimmer betrete.
- Nach einem Kontakt mit biologischen Körperflüssigkeiten
- Nachdem man die Patientenumgebung berührt hat.

Frage 35

Welche Reihenfolge müsst Ihr bei einer Blutentnahme bei einem Patienten einhalten?

- Ich ziehe die Handschuhe aus
- Ich ziehe die Handschuhe an
- Bevor ich die Handschuhe anziehe, desinfiziere ich die Hände
- Ich desinfiziere die Hände und taste die Vene
- Ich führe eine Händedesinfektion durch
- Ich führe die Blutentnahme durch

Frage 37

Das Tragen der Handschuhe ersetzt die Händehygiene

- Ja
- Nein

Frage 30

Antwort:

- Das HDM kann so oft wie nötig gebraucht werden.

Frage 34

Antwort:

- Nach einem Kontakt mit biologischen Körperflüssigkeiten
- Nachdem die Patientenumgebung berührt hat.

Frage 35

Antwort:

- Ich desinfiziere die Hände und taste die Vene
- Bevor ich die Handschuhe anziehe, desinfiziere ich die Hände
- Ich ziehe die Handschuhe an
- Ich führe die Blutentnahme durch
- Ich ziehe die Handschuhe aus
- Ich führe eine Händedesinfektion durch

Frage 37

Antwort: Nein

Das Tragen der Handschuhe ersetzt die Händedesinfektion nicht. Die Handschuhe müssen jedes Mal gewechselt werden, wenn eine Händedesinfektion durchgeführt werden muss.